

DOLOXCAM
Meloxicam
Tabletas Recubiertas
Vía Oral

Composición:

Cada tableta Recubierta contienen:

Meloxicam.....15 mg

Excipientes c.s.p..... 1 tableta

Descripción:

Doloxcam Tabletas, es un antiinflamatorio analgésico no esteroideo cuyo poder inhibitorio selectivo de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2) que lo destaca de los demás Aines.

Indicaciones terapéuticas: Doloxcam Tabletas esta indicado en todo cuadro inflamatorio y doloroso, como artritis reumatoide aguda o crónica, inflamación pélvica aguda, dismenorrea primaria, salpingitis, cervicitis, endometritis, tensión premenstrual, periartritis del hombro o de cadera, distensiones musculares, osteoartritis, síndrome doloroso de la columna vertebral, traumatismos, contusiones, torceduras, lumbalgias, luxaciones, bursitis, tendinitis, procesos dolorosos agudos, coadyuvantes en procesos inflamatorios del árbol respiratorio, oídos, nariz, gargantas. Tales como amigdalitis, otitis, sinusitis, laringitis y analgesia post-operatoria.

Contraindicaciones:

-En hipersensibilidad al Meloxicam.

-No debe ser administrado a niños y adolescentes menores de 15 años.

-Su uso durante el embarazo y la lactancia está contraindicado.

El Meloxicam deberá ser usado sólo bajo determinadas medidas de cuidado (emergencia).

En pacientes que hayan reaccionado sensibles a antiflogísticos no esferoidales o analgésicos, por ejemplo en ataque de asma, reacciones cutáneas o rinitis aguda.

EL Meloxicam puede ser usado sólo después de una fuerte evaluación de la relación Beneficio-Riesgo en niños menores de seis años.

El Doloxcam deberá ser usado sólo bajo cuidados médicos especiales:

-En pacientes con indicios de úlcera gastrointestinal en su historial clínico.

-En pacientes con alteraciones gastrointestinales.

-En pacientes con funciones renales o hepáticas limitadas.

-En pacientes con alta presión sanguínea y/o insuficiencia cardíaca.

-En pacientes ancianos.

Reacciones secundaria y adversa: La tolerancia del fármaco es buena en la mayoría de los pacientes pudiendo presentarse ocasionalmente dispepsia, náuseas, vómitos, epigastralgias, constipación, flatulencia, diarrea. A nivel cutáneo prurito, exantema, urticaria, reacciones de hipersensibilidad. Además cefaleas, palpitaciones, edema, vértigo, acúfenos, mareos, somnolencia. En raras oportunidades anemias, leucopenia, alteración transitoria de las enzimas hepáticas y de los parámetros renales (urea, creatinina).

Se han descrito reacciones de hipersensibilidad cruzada con otros antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina y desencadenamiento de crisis asmáticas.

Interacciones medicamentosas y de otro género:

El uso al mismo tiempo de Meloxicam con preparados de litio y digoxina, puede aumentar los niveles de litio y digoxina en suero.

El uso al mismo tiempo con diuréticos ahorrantes de potasio se deberá tener un control especial de los valores de potasio, ya que el Meloxicam, como otros antirreumáticos no esferoidales, puede llevar a una hipercalemia. Un debilitamiento del efecto de diuréticos y antihipertónicos es posible la dosificación al mismo tiempo de corticoides y otros antiinflamatorios aumentan el riesgo de sangramientos gastrointestinales. La dosificación al mismo tiempo de ácido acetilsalicílico lleva a una reducción de la concentración de Meloxicam en el suero.

Los estudios clínicos no mostraron indicios de interacción entre el Meloxicam y los anticoagulantes; a pesar de esto, se recomienda una prueba del cuadro de coagulación como medida de precaución. No tiene influencias sobre pruebas de laboratorio.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental: No existen reportes de toxicidad crónica. No hay antidotos específicos que neutralicen el Meloxicam en caso de ingesta voluntaria o accidental, en dosis masivas del fármaco se aconseja hacer lavado gástrico, cuidados generales y vigilancia.

Posología:

Vía de administración: Oral

Dependiendo de la intensidad del dolor y la severidad de la inflamación se recomienda, 7.5 mg ó 15 mg fraccionado en dos tomas o una vez al día.

La dosis máxima recomendable es de 15 mg al día.

La dosis puede ser reducida en caso necesario.

Conservación: Almacénese en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 30°C.

Presentación: Caja conteniendo 50 tabletas Recubiertas.

Legendas de protección:

No se deje al alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Fabricado por:

Laboratorios Ameripharma, S.R.L.

República Dominicana.

Para: GP Médica, S.R.L.

República Dominicana.

