

OVCLEAN - T

FLUCONAZOL 37.5 mg + TINIDAZOL 500 mg + CLINDAMICINA
312.5 mg
Capletas Recubiertas
Uso Oral

COMPOSICION:

Cada Capleta Recubierta Contiene:

Fluconazol -----37.5 mg
Tinidazol -----500.0 mg
Clindamicina HCl
Equivalente a Clindamicina Base -----312.5 mg
Excipiente C.S.P.-----1 Capleta

INDICACIONES TERAPÉUTICA:

Este medicamento está indicado en pacientes con diagnóstico demostrado o de alto riesgo, multitratadas, con enfermedad pélvica inflamatoria, vaginitis recurrente y/o relacionada a infertilidad con infecciones vaginales mixtas causadas por Candida, Trichomonas, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis y bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis.

CONTRAINDICACIÓN:

Hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula, pacientes con discrasias sanguíneas o trastornos neurológicos de tipo orgánico. No debe administrarse este medicamento en pacientes con lesiones orgánicas activas del sistema nervioso central, en casos de disfunción hepática o renal grave y durante el embarazo y la lactancia.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración oral.

DOSIS:

La dosis recomendada es de 2 Capletas cada 12 horas durante un día.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos reportados en los estudios clínicos realizados con la combinación son: cefalea, náuseas, vómitos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Este medicamento se debe utilizar con precaución en pacientes con transaminasas elevadas por hepatitis.

Prescribir con precaución en personas con historial de padecimientos gastrointestinales, en particular de colitis, ya que es posible que desencadene súper-infecciones por organismos no sensibles, del tipo de la colitis pseudomembranosa.

Embarazo y Lactancia: Deberá evitarse el uso durante el embarazo y la lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

La administración conjunta de fluconazol y fenitoína puede aumentar los niveles de esta última.

La coadministración con múltiples dosis de hidroclorotiazida incrementa las concentraciones plasmáticas de fluconazol en un 40%.

OVCLEAN - T

FLUCONAZOL 37.5 mg + TINIDAZOL 500 mg + CLINDAMICINA
312.5 mg
Capletas Recubiertas
Uso Oral

COMPOSICION:

Cada Capleta Recubierta Contiene:

Fluconazol -----37.5 mg
Tinidazol -----500.0 mg
Clindamicina HCl
Equivalente a Clindamicina Base -----312.5 mg
Excipiente C.S.P.-----1 Capleta

INDICACIONES TERAPÉUTICA:

Este medicamento está indicado en pacientes con diagnóstico demostrado o de alto riesgo, multitratadas, con enfermedad pélvica inflamatoria, vaginitis recurrente y/o relacionada a infertilidad con infecciones vaginales mixtas causadas por Candida, Trichomonas, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis y bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis.

CONTRAINDICACIÓN:

Hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula, pacientes con discrasias sanguíneas o trastornos neurológicos de tipo orgánico. No debe administrarse este medicamento en pacientes con lesiones orgánicas activas del sistema nervioso central, en casos de disfunción hepática o renal grave y durante el embarazo y la lactancia.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración oral.

DOSIS:

La dosis recomendada es de 2 Capletas cada 12 horas durante un día.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos reportados en los estudios clínicos realizados con la combinación son: cefalea, náuseas, vómitos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Este medicamento se debe utilizar con precaución en pacientes con transaminasas elevadas por hepatitis.

Prescribir con precaución en personas con historial de padecimientos gastrointestinales, en particular de colitis, ya que es posible que desencadene súper-infecciones por organismos no sensibles, del tipo de la colitis pseudomembranosa.

Embarazo y Lactancia: Deberá evitarse el uso durante el embarazo y la lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

La administración conjunta de fluconazol y fenitoína puede aumentar los niveles de esta última.

La coadministración con múltiples dosis de hidroclorotiazida incrementa las concentraciones plasmáticas de fluconazol en un 40%.

OVCLEAN - T

FLUCONAZOL 37.5 mg + TINIDAZOL 500 mg + CLINDAMICINA
312.5 mg
Capletas Recubiertas
Uso Oral

COMPOSICION:

Cada Capleta Recubierta Contiene:

Fluconazol -----37.5 mg
Tinidazol -----500.0 mg
Clindamicina HCl
Equivalente a Clindamicina Base -----312.5 mg
Excipiente C.S.P.-----1 Capleta

INDICACIONES TERAPÉUTICA:

Este medicamento está indicado en pacientes con diagnóstico demostrado o de alto riesgo, multitratadas, con enfermedad pélvica inflamatoria, vaginitis recurrente y/o relacionada a infertilidad con infecciones vaginales mixtas causadas por Candida, Trichomonas, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis y bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis.

CONTRAINDICACIÓN:

Hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula, pacientes con discrasias sanguíneas o trastornos neurológicos de tipo orgánico. No debe administrarse este medicamento en pacientes con lesiones orgánicas activas del sistema nervioso central, en casos de disfunción hepática o renal grave y durante el embarazo y la lactancia.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración oral.

DOSIS:

La dosis recomendada es de 2 Capletas cada 12 horas durante un día.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos reportados en los estudios clínicos realizados con la combinación son: cefalea, náuseas, vómitos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Este medicamento se debe utilizar con precaución en pacientes con transaminasas elevadas por hepatitis.

Prescribir con precaución en personas con historial de padecimientos gastrointestinales, en particular de colitis, ya que es posible que desencadene súper-infecciones por organismos no sensibles, del tipo de la colitis pseudomembranosa.

Embarazo y Lactancia: Deberá evitarse el uso durante el embarazo y la lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

La administración conjunta de fluconazol y fenitoína puede aumentar los niveles de esta última.

La coadministración con múltiples dosis de hidroclorotiazida incrementa las concentraciones plasmáticas de fluconazol en un 40%.

La Clindamicina puede potenciar los efectos de los agentes relajantes musculares no despolarizantes. El caolín disminuye su absorción.

Cuando se combina Tinidazol con alcohol, puede producir un efecto similar a disulfiram (calambres abdominales, náusea, vómito, sofocos). Puede aumentar el efecto de los anticoagulantes y la toxicidad del litio.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

En caso de que exista una, se recomienda tratamiento sintomático con medidas de soporte y lavado gástrico. Si es necesario, una diuresis forzada incrementará, muy probablemente, la velocidad de eliminación. Una sesión de hemodiálisis de tres horas disminuye los niveles plasmáticos aproximadamente al 50%.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco y seco, a una temperatura inferior a 30 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo 4 Capletas Recubiertas y caja conteniendo 1 Capleta Recubierta para muestra médica.

Fabricado Por:

LABORATORIO AMERIPHARMA, S.R.L.

Rep. Dom

Para:

GP MEDICA S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dom

La Clindamicina puede potenciar los efectos de los agentes relajantes musculares no despolarizantes. El caolín disminuye su absorción.

Cuando se combina Tinidazol con alcohol, puede producir un efecto similar a disulfiram (calambres abdominales, náusea, vómito, sofocos). Puede aumentar el efecto de los anticoagulantes y la toxicidad del litio.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

En caso de que exista una, se recomienda tratamiento sintomático con medidas de soporte y lavado gástrico. Si es necesario, una diuresis forzada incrementará, muy probablemente, la velocidad de eliminación. Una sesión de hemodiálisis de tres horas disminuye los niveles plasmáticos aproximadamente al 50%.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco y seco, a una temperatura inferior a 30 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo 4 Capletas Recubiertas y caja conteniendo 1 Capleta Recubierta para muestra médica.

Fabricado Por:

LABORATORIO AMERIPHARMA, S.R.L.

Rep. Dom

Para:

GP MEDICA S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dom

La Clindamicina puede potenciar los efectos de los agentes relajantes musculares no despolarizantes. El caolín disminuye su absorción.

Cuando se combina Tinidazol con alcohol, puede producir un efecto similar a disulfiram (calambres abdominales, náusea, vómito, sofocos). Puede aumentar el efecto de los anticoagulantes y la toxicidad del litio.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

En caso de que exista una, se recomienda tratamiento sintomático con medidas de soporte y lavado gástrico. Si es necesario, una diuresis forzada incrementará, muy probablemente, la velocidad de eliminación. Una sesión de hemodiálisis de tres horas disminuye los niveles plasmáticos aproximadamente al 50%.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco y seco, a una temperatura inferior a 30 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo 4 Capletas Recubiertas y caja conteniendo 1 Capleta Recubierta para muestra médica.

Fabricado Por:

LABORATORIO AMERIPHARMA, S.R.L.

Rep. Dom

Para:

GP MEDICA S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dom