## **OV Plus**

#### CLOTRIMAZOL, SULFISOXAZOLE Y ALANTOINA

### **OVULOS**

### **COMPOSICIÓN:**

Cada ovulo contiene:

Clotrimazol	200mg
Sulfisoxazole	300mg
Alantoina	60mg

#### DESCRIPCIÓN

OV Plus Óvulos ha sido formulado para proporcionar en una sola presentación un tratamiento eficaz para la variedad de infecciones del tracto vaginal. Combina la acción antimicótica del clotrimazol con la acción antibacteriana del Sulfisoxazole y la acción de la alantoina que promueve y acelera los procesos de cicatrización natural, esto significa que ayuda a limpiar y a deshacer el tejido necrótico, acelerando el crecimiento del tejido nuevo sano.

### Indicaciones terapéuticas:

OV PLUS, Óvulos está indicado en infecciones Cervicovulvovaginales mixtas por Cándida albicans (Moniliasis), Trichomonas (tricomoniasis), gérmenes grampositivos y gramnegativos, hemofilos vaginales y otros microorganismos sensibles a los principios activos de este medicamento.

Es práctico para sanear el canal del parto durante las 4 a 6 últimas semanas del embarazo.

# Contraindicaciones y precauciones:

Hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes. Investigaciones experimentales y clínicas indican que no deben esperarse durante el embarazo efectos indeseables sobre la madre ni sobre la criatura con el empleo de este medicamento.

## Reacciones secundaria y adversa:

OV Plus es habitualmente bien tolerado; sin embargo, en algunos casos, puede causar ardor al iniciar el tratamiento, síntoma que desaparece al mantener la aplicación de los óvulos, no siendo necesario interrumpir la terapia. Puede producir dolor o calambre abdominal, ardor o irritación del pene del partner sexual, ardor o aumento de la frecuencia urinaria, vulvitis, sabor metálico, efectos sobre el SNC (vértigos, molestias por la luz, cefalea), sequedad de la boca, lengua saburral, disturbios gastrointestinales (diarrea, náusea o vómito), pérdida de apetito, orina oscura.

Interacciones medicamentosas v de otro género: No se han reportado interacciones con medicamentos. OV Plus puede reducir la efectividad y seguridad de los productos de látex (por ejemplo, condones y diafragmas) y espermaticidas vaginales, sin embargo, este efecto es temporal y se presenta sólo durante el tratamiento. Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad: La toxicidad del Sulfisoxazole, Alantoina y Clotrimazol por vía vaginal es irrelevante ya que los fármacos no tienen una absorción significativa. Los estudios in vitro utilizando Sulfisoxazole, Alantoina y Clotrimazol no han mostrado que los fármacos sean mutagénico. En estudios a largo plazo con ratas y ratones, tanto el Clotrimazol como el sulfisoxazole no han mostrado ser carcinogénicos, teratogénicos ni tener efectos sobre la fertilidad. Posología:

## Vía de administración: Vaginal

Óvulos: Durante seis días seguidos se introduce un óvulo cada día, lo más profundo posible en la vagina antes de acostarse.

Si es necesario puede repetirse el tratamiento una semana después.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental: No se ha informado respecto a la presencia de casos de sobredosis con este producto. Pero si se presentan consulte a su médico.

### **Presentaciones:**

OV Plus Óvulos: Caja conteniendo 6 óvulos.

**Recomendaciones sobre almacenamiento:** Manténgase a temperatura ambiente a no más de 30°C. En un lugar fresco y seco.

## Levendas de protección:

No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica.

## Fabricado Por:

Laboratorios Ameripharma, S.R.L. República Dominicana. Para: GP Médica, S.R.L. República Dominicana.