

VIT- NATAL TABLETAS RECUBIERTAS VÍA ORAL

Composición:

Cada Tableta Recubierta contiene:

Vitamina A 6.9 mg, Vitamina D3 1.4 mg, Vitamina E 50% polvo 26 mg, Vitamina C 70 mg, Vitamina B1 3.0 mg, Vitamina B2 3.4 mg, Vitamina B6 4 mg, Nicotinamida 17.0 mg, Ácido fólico 0.60 mg, Vitamina B12 0.0022 mg, Fumarato ferroso 30 mg (Equivalente a 9.9 mg) Óxido de zinc 15.0 mg, Citrato de Calcio 593.75 mg.

Excipientes c.s.p..... 1 Tableta

Descripción:

Vit- Natal Tabletas recubiertas es un multivitamínico prenatal que es utilizado como Suplemento para el embarazo.

Indicaciones terapéuticas:

Vit- Natal Tabletas recubiertas está indicado especialmente en períodos de embarazo y lactancia como complemento alimenticio. Preferiblemente debe administrarse durante el período periconcepcional por el aporte de ácido fólico para prevenir alteraciones en el desarrollo del tubo neuronal del embrión.

Contraindicaciones:

Vit- Natal Tabletas recubiertas está contraindicado en los pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Precauciones y Advertencias generales:

Después de la administración oral se puede presentar sensibilización alérgica a cualquiera de los componentes de las tabletas. Vit-natal Tabletas está indicado para el tratamiento de la anemia perniciosa. Administrar de acuerdo con la dosis recomendada, si se ingieren grandes cantidades de este medicamento puede producirse hipervitaminosis.

Reacciones secundaria y adversa:

Vit- Natal Tabletas recubiertas es bien tolerado.

Raramente se puede presentar malestar gastrointestinal como náuseas, diarrea, constipación y regurgitación con sabor a alguno de los componentes.

Adminístrese de acuerdo con la dosis recomendada; si se ingieren grandes cantidades de este medicamento puede producirse hipervitaminosis. No administrar este medicamento a personas con úlcera péptica o insuficiencia renal y/o hepática.

Aminoglucósidos

Levodopa: No se recomienda el uso concomitante de vitamina B6 con levodopa, ya que se revierten los efectos antiparkinsonianos de la levodopa con solo 5 mg de Piridoxina administrada en forma oral.

Metotrexato: El ácido fólico puede interferir con los efectos antifolatos del metotrexato. Fenitoína: La ingestión de ácido fólico puede reducir la efectividad de la fenitoína debido a un aumento del metabolismo de la fenitoína.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental:

En caso de ingestión accidental o inadvertida de una dosis mayor a la recomendada, se debe consultar inmediatamente al médico.

Posología

Vía de administración: Oral

Vit-Natal tabletas se debe administrar 1 Tableta al día. Preferiblemente después del desayuno, sin masticar. No consumir más de la dosis indicada.

Conservación: Almacénese en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 30°C.

Presentación: Caja conteniendo 30 Tabletas recubiertas.

Leyendas de protección:

No se deje al alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Fabricado por:

Laboratorios Ameripharma, S.R.L.

República Dominicana.

Para: GP Médica, S.R.L.

República Dominicana.

Interacciones medicamentosas y de otro género:

